

POMME AU LOGIS

LA TAILLE LORETTE

Nous avons évoqué MR LORETTE dans le journal numéro huit, nous allons maintenant profiter du 15 août pour essayer de décrire au mieux sa méthode de taille, sachant qu'il recommandait une pratique sur des sujets vigoureux et ayant été formés depuis la plantation à cet effet et que sa description occupe tout un fascicule.

A QUOI CORRESPOND CETTE TAILLE

La taille Lorette est une taille fruitière qui est effectuée en période de sève. Elle s'effectue d'avril à septembre sur des rameaux de l'année de la grosseur d'un crayon et dont la croissance se termine, fait visible par sa couleur brune et la présence d'un bourgeon terminal. La longueur étant de 20 à 25 centimètres.

Son but est d'affaiblir la circulation de la sève pour privilégier la transformation en dards et/ou brindilles, des yeux stipulaires à la base de chaque bourgeon.

Nous évoquerons en parallèle l'adaptation faite par M Bourdin successeur de M LORETTE car elle assure éventuellement une sortie en taille trigemme .

Début avril, Mr Lorette traitait, lors de la formation des arbres, les prolongements en les courbant afin d'obtenir une régularité dans la formation des futures coursonnes par répartition de la sève. Il réduisait ces prolongements fin avril en coupant à 5 ou 6 cm de leurs sommets.

Cette partie formation, notamment en pyramide lorette, mérite à elle seule un chapitre, nous reviendrons sur le sujet ultérieurement.

La taille du 15 Juin va déterminer l'évolution des yeux stipulaires, qui est dépendante de la date de la taille. On pourra en tenir compte pour les années suivantes. Les brindilles sont à préserver

Au 15 juillet, nous guiderons comme précisé dans les croquis ci-dessous suivant le résultat obtenu

Au 15 août, on traite les rameaux de la grosseur d'un crayon qui se sont développés, en les coupant de manière identique, pour favoriser les dards en cours de croissance.

La formation des coursonnes se fera années après années. Au 15 septembre, la sève étant ralentie, le départ à bois est peu probable, on pourra rabattre les coursonnes sur les dards et les boutons.

Mr LORETTE

Trois cas possibles

Coupe en dessous du 1^{er} oeil axillaire

Pousse de 2 rameaux



Taille trop précoce
Coupe au -dessus des
feuilles infertiles

Pousse 1 rameau et 1 dard ou 1 brindille



Taille un peu trop
précoce, sur arbre
jeune, on coupe la
pousse

Pousse de 2 dards ou une ou deux brindilles



Taille faite à bonne
date et réussie, en
septembre, nous
retirerons le rameau
infertile en laissant les
développements des
dards et/ou brindilles

AU 15 JUIN

AU 15 JUILLET

Coupe au -dessous du 1^{er} oeil axillaire

Taille trop précoce, on
conserve le mieux
placé, et on le coupe à
4 feuilles fertiles,
retour au trigemme



Taille un peu trop
précoce, on coupe à 4
feuilles fertiles,
retour au trigemme



Taille faite à bonne
date et réussie, en
septembre, nous
retirerons le rameau
infertile en laissant
les développements
des dards et /ou
brindilles

MR BOURDIN

Vous pouvez essayer la taille lorette qui devrait se révéler productive. Pour plus de détails, vous pouvez consulter le fascicule de Mr Louis Lorette paru dans la revue 'jardinage'

