

LA TENTHREDE LIMACE

En faisant le tour des poiriers en espalier de l'Abbaye de Laval-Dieu, j'ai eu une très mauvaise surprise. Sur deux espaliers, j'ai vu de très nombreuses feuilles avec des traces noires ou grises et de nombreuses petites larves ressemblant à des petites limaces. C'était les larves de la tenthrède limace.



Les larves de la tenthrède du cerisier sont recouvertes de mucus sombre. Photo: L. Ingram, www.forestryimages.com

L'adulte est une petite guêpe qui mesure moins d'un centimètre, entièrement noire, qui apparaît au printemps et pond ses œufs à l'intérieur de petites incisions qu'elle pratique sous la cuticule de la face supérieure des feuilles.



Le corps des tenthrèdes adultes est noir, seules les pattes peuvent être plus claires.

Si ces larves sont en nombre, elles peuvent compromettre la vie et l'avenir des jeunes arbres si on n'y prend pas garde. Le corps de ces larves est recouvert d'un mucus noirâtre et gluant qui les fait ressembler à des petites limaces. J'ai retrouvé trace de ces parasites sur de vieux livres. Certains préconisaient pour leur destruction un traitement avec de la chaux en poudre ou du soufre. Personnellement, pour contrer cette attaque, je passe du temps tous les jours à les écraser sur les feuilles. Actuellement, elles ont pratiquement disparu mais de nombreuses feuilles ne peuvent plus remplir la fonction de photosynthèse. La tenthrède sévit aussi sur les cerisiers et les pruniers. Une deuxième génération peut apparaître en fin d'été. Les larves hibernent en terre assez profondément et se transforment en nymphe au printemps suivant.